UFA NÜTZLINGE AUXILIAIRES
SAMEN | SEMENCES

Gebrauchsanleitung GranMet GR

GranMet GR ist ein biologisches Insektizid zur Bekämpfung von Juni- und Gartenlaubkäfer-Engerlingen in Wiesen- und Rasenflächen. Der parasitische Pilz *Metarhizium anisopliae* ist auf sterilisieren Gerstenkörnern aufgebracht. Im Boden beginnt der Pilz zu wachsen. Bei Berührung infizieren sich die Engerlinge mit dem Pilz und verenden ca. 3-14 Tage nach der Infektion.

Anwendung

GranMet GR wird in einer Dosierung von 100 kg/ha (=1 kg/100m^2) ausgebracht. GranMet GR muss in den Boden eingearbeitet werden, mindestens 5 cm und bis 10 cm tief.

Maschinelle Ausbringung Gartenbau: Rasen tief schneiden, aerifizieren, Schnittgut entfernen, kreuz und quer mindestens 6 cm aerifizieren, Zapfen entfernen, GranMet GR streuen. Mit Besen in Löcher verteilen, mit UFA Rasenerde und Besen einbeseln. Bei Neuansaaten mit Bodenfräse mindestens 5 cm tief einarbeiten. **Sämaschine**: Ablagetiefe 5-10 cm

Manuelle Ausbringung auf Kleinflächen: Mit Spaten Schlitze öffnen, Abstand 10 cm. GranMet GR streuen, Schlitze schliessen. Oder mit Aerifiziergabel oder Setzholz ca. 15 Löcher/m^2 stechen, GranMet GR streuen, Löcher mit Rasenerde füllen/schliessen.

Anwendungszeitpunkt

GranMet GR wird ab April bis Juli und im September ausgebracht. Nicht in trockenen Boden ausbringen, der Pilz wächst nur bei ausreichender Bodenfeuchte

Lagerung: Bei unter 8°C, vor Licht geschützt (Kühlschrank) bis zu 12 Monate.

Sicherheitshinweise:

- Aerosol nicht einatmen.
- *Berührung mit der Haut vermeiden.*
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanleitung einzuhalten.
- Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.
- S 02 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen

UFA-Samen Nützlinge, Nordring 2, 4147 Aesch
nuetzlinge@fenaco.com, Tel 058 434 32 82

Mode d'emploi GranMet GR

GranMet GR est un insecticide biologique pour la lutte contre les vers blancs (larves) du hanneton horticole et du hanneton de la St Jean dans les prairies et les gazons. Il contient le champignon entomopathogène *Metarhizium anisopliae* inoculé sur des grains d'orge stérilisés. Les vers blancs s'infectent lorsqu'ils entrent en contact avec le champignon et ils meurent après 3 à 14 jours.

Utilisation

GranMet GR est appliqué à la dose de 100 kg/ha (=1 kg/100m^2). GranMet GR doit être incorporé dans le sol, à une profondeur minimale de 5 cm et jusqu'à 10 cm.

Application mécanique: tondre le gazon très court, scarifier, évacuer les déchets, aérer (carottage) en long et en large à au moins 6 cm de profondeur, ramasser les carottes de terre. Epandre GranMet GR, l'enfouir dans les trous avec un balai, en combinaison avec UFA Terre à gazon. Pour des nouveaux semis, incorporer GranMet GR avec une fraise à au moins 5 cm de profondeur, ou utiliser un semoir qui permet de déposer les grains à une profondeur de 5 à 10 cm. **Application manuelle** sur petites surfaces: ouvrir des fentes espacées de 20 cm avec une bêche. Epandre GranMet GR, refermer les fentes. Ou faire environ 15 trous/m^2 avec une fourche d'aération du gazon ou un plantoir, épandre GranMet GR, puis combler les trous avec de la terre à gazon.

Périodes d'utilisation

GranMet GR s'emploie d'avril à juillet et en septembre. Ne pas l'épandre dans un sol sec, car le champignon se développe seulement si l'humidité est suffisante.

Stockage: à une température inférieure à 8°C, protégé de la lumière (armoire frigorifique) jusqu'à 12 mois.

Indications relatives aux dangers :

- Ne pas respirer les aérosols.
- Eviter le contact avec la peau.
- Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.
- Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.
- S 02 Conserver hors de la portée des enfants.
- SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

UFA-Samen Nützlinge, Nordring 2, 4147 Aesch
nuetzlinge@fenaco.com, Tel 058 434 32 82